

FORMIDOL 80 ml proužky do úlu

Přípravek v klinickém zkoušení

Jen pro zvířata! Acidum formicum Určeno pro včely

**Vyhrazený veterinární léčivý přípravek
proti roztoči Varroa a spórám nosemy a zvápenatění.**

Velikost balení 2 proužky



Pásek v odpařovacím obalu se zavěsí do meziplástové mezery do nejvyššího nástavku s plodem sousedící s mezoplástovou uličkou s plodem.

Čtěte příbalovou informaci!

Obsah: léčivá látka acidum formicum (kyselina mravenčí) 85% 80 ml.

Med - bez ochranné lhůty. Přípravek se používá jen když v úle není zralý med.

Číslo šarže: 4/ 2012

Držitel povolení ke klinickému
zkoušení: **001/2012/CT**
Výzkumný ústav včelařský Dol
252 66 Libčice nad Vltavou
Telefon: 220941259

POZOR !



ŽÍRAVINA

Spotřebovat do: **10-2013**

Uchovávat při teplotě do 25°C

Pracovat v rukavicích a s brýlemi.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
Přípravek uchovávejte mimo dosah
dětí. Suché desky spalte.

INFORMACE PRO CHOVATELE
Formidol 80 ml proužky do úlu
k léčení varroázy včel

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE POVOLENÍ KE KLINICKÉMU ZKOUŠENÍ A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Máslovice - Dol 94
252 66 Libčice n. Vlt.
tel. 220941259, e-mail: beedol@beedol.cz

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Formidol 80 ml proužky do úlu, odparné desky
síla 80 ml, léková forma odparné desky, určeno pouze pro včely, léčivá látka kyselina mravenčí

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka: kyselina mravenčí, 80 ml 85%kyseliny v jednom proužku).
Ostatní látky: 4 desky bělené zušlechtěné buničiny 90 x 125 mm, síla 1,4 položené na sebe

4. INDIKACE

Formidol 80 ml je určen k hubení roztočů Varroa destructor přítomných na včelách, a to i v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod. Používá se převážně v létě a podletí k ochraně zimujících generací včel. Hubí také spory nosemozy a zvápenatění.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn zralý med před vytáčením určený pro lidský konzum. Jedná se hlavně o med z hlavních snůšek, např. řepka, akát, s medobraním v měsíci červnu.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky na včelstva se mohou projevit při vkládání proužku do úlů při teplotách nad 25°C nebo při malém česně, interakce s jinými léčivy nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro jedno středně silné včelstvo se použije jeden proužek, dva proužky u velkých úlových prostorů s objemem nad 90 litrů. V nejhořejším nástavku s plodem se vyjme plást tak aby se vytvořila mezera, v jejich sousední meziplástové mezeře je plod. Pásek se zavěsí do vzniklé mezery na laťku nahrazující horní loučku plástu a úl se uzavře. Česno ponecháme otevřené o maximální velikosti 15 x 400 mm. Základní expozice je stanovena na 12 dnů, kdy se většina kyseliny odpaří. Kyselina se odpařuje dvěma

otevřenými rohy na spodním okraji pásků a dvěma otvory na bočních stěnách pásků. Ošetření je možné opakovat po 2-3 týdnech.

Léčivá látka, kyselina mravenčí proniká víčkem plodu, část roztočů na larvách a kuklách zabíjí. Páry kyseliny mravenčí v úlovém prostoru ničí spory mosemy a zvápenatění plodu.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic. Rovněž může dojít k poškození menšího počtu mladušek. Neznamená to však žádné ohrožení včelstva. V případě zvýšeného rozrušení včelstva pozorovaného především na česně – včely se hrnou ven – stačí dočasně zvětšit česno nebo úlový prostor odvětrat.

Formidol F vkládáme při denních teplotách mezi 20 - 30°C, nevkládáme při teplotách nad 30°C, nebo při předpovědi, že teploty nad 30°C nastanou do 3 dnů, v tomto případě počkáme na příznivější předpověď.

Postup vyjmutí a zavěšení pásku Formidol 80 ml je uveden na fotografiích pod bodem 16

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med : Po vyjmutí odpařených proužku je zralý med možné vytáčet.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Zvláštní opatření nejsou nutná. Uchováváme za teploty do 25°C odděleně od potravin a krmiv mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přípravek obsahuje kyselinu mravenčí. Při vkládání, při manipulaci s jednotlivými proužky se musí používat osobní ochranné prostředky, gumové rukavice a brýle. Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Při nechtěném kontaktu kůže s proužkem napuštěným kyselinou mravenčí zasažené místo okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí kontaminovanou rukou.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODNĚNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Přípravek obsahuje kyselinu mravenčí, po odparu v úlovém prostoru zbývá čistá celulóza v PE obalu, ten je možné likvidovat spálením. Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

15.02.2012

15. DALŠÍ INFORMACE

Doba použití je vyznačena na obalu.

Balení obsahuje 2 proužky, velké balení v katronové krabici obsahuje 20 balení, tj. 40 proužků.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu najdete v bodu č. 1 tohoto dokumentu.

16. SCHÉMA ROZBALENÍ A VLOŽENÍ DO ÚLU



a) Obal s dvěma proužky otevřeme odstrižením části obalu u uzavíracího sváru




b) Mezi proužky v obalu zasuneme plochý tupý předmět a vytáhneme závěs proužku



c) Do oka závěsu nasuneme horní loučku rámků nebo jiný závěs



d) Přidržíme obal a tahem za horní loučku vytáhneme závěs z obalu



e) Do úlového prostoru zavěsíme zpravidla jeden proužek



f) Do prostorů o objemu nad 90 litrů použijeme raději proužky dva